


AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

Circonscription

PROVENCE, ALPES, CÔTE D'AZUR, CORSE
 SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
 Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
 LUCCIANA - 20290 BORGIO -

 (95) 36.05.70


Edition Speciale Corse

Bulletin Technique n° 67
 du 31 Octobre 1985

-
- Enfin la pluie ..., mais entre le 21 Octobre
 et le 28 Octobre, à la station de CASAMOZZA,
 253 mm de pluie ont déjà été enregistrés.
-

Dés que la pluie va cesser, pensez aux **cicadelles des agrumes**
 et aux **traitements d'automne des arbres fruitiers**.

Après les limaces, les altises, faisons le point sur un autre ravageur
 du colza : le **charançon du bourgeon terminal**.

AGRUMES

Cicadelles des Agrumes:

Toutes les captures enregistrées dans notre réseau de piégeage sont
 restées faibles. Un traitement généralisé n'est pas nécessaire dans la
 plupart des cas. Toutefois, surveillez bien vos plantations situées à
 proximité de vignes. Les piqûres de cicadelles sont redoutables car elles
 se traduisent par une petite tache de 4 à 5 mm de diamètre.

Si les piqûres sont nombreuses, les fruits sont déclassés.

Si vous envisagez un traitement généralisé, préférez les matières actives
 suivantes.

- méthidathion	ULTRACIDE
- parathion	NS
- formothion	ANTHIOFORT
- diméthoate	NS
- méthomyl	LANNATE
- deltaméthrine	DECIS
- cyperméthrine	NS

ARBRES FRUITIERS

Traitements d'automne des arbres fruitiers

Dans certaines parcelles, on a pu observer, en particulier sur pêchers,
 des bourgeons déjà gonflés, le temps très chaud des mois d'août, septembre,
 octobre étant certainement la cause de ces anomalies.

P.1.26

observez donc vos plantations et soyez particulièrement prudents en utilisant du cuivre. Les risques de phytotoxicité augmentent

*** CHANCRE EUROPEEN DU POMMIER**

Supprimer les chancres au sécateur et effectuer un traitement cuprique à 500 g de cuivre métal/hl dès la chute du premiers tiers des feuilles.
A renouveler après la chute totale des feuilles, si des pluies sont intervenues.

*** TAVELURE DU POMMIER, ET DU POIRIER**

Effectuer un traitement après récolte, avant la chute des feuilles, à base de :

- Urée (46 % d'azote) à raison de 120 kg/ha
- Bitertanol 25 g de matière active/hl (0,100 kg de BAYGOR 25/hl)
- Fénarimol -4 g de matière active /hl (0,100 l de RUBIGAN/hl)

si vous utilisez ces deux derniers produits maintenant, il faudra éviter d'employer systématiquement des deux matières actives en préventif au cours de la prochaine campagne.

*** CLOQUE DU PECHER ET DE L'AMANDIER**

Dés la fin de la chute des feuilles, effectuer un traitement cuprique à la dose de 500 g de cuivre métal/hl. Ce traitement n'est que le complément de celui a effectuer en pré-débourrement en 1985.

*** CORYNEUM, CYLINDROSPORIOSE, CHANCRE DU CERISIER**


*** CORYNEUM, CLOQUE DU PRUNIER**

1 à 2 interventions au cours de la chute des feuilles avec une bouillie cuprique à la dose de 250 g de cuivre métal/ha. Cette dose peut-être portée à 500 g en fin de chute des feuilles sur bois bien aoutés.

COLZA :

Charançon du bourgeon terminal

taille réelle 2,5 à 3,7 mm
noir brillant à reflets bronzés avec une tache blanchâtre dorsale.
Le traitement sera effectué 10 à 15 jours après les premières captures obtenues dans les cuvettes de piègeage.
Utilisez un insecticide choisi parmi ceux destinés à lutter contre les altises



----- 0000 -----

(C) : SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX 1985 - Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.